



老周就是为了救这只花鼠被咬了一口。

晚报记者 张翼飞 图

□晚报记者 张翼飞

最近几天,伏牛南社区的巡防队员老周有点心绪不宁。

8月12日上午,在省直第三人民医院门前,老周看到一群人在追打一个老鼠一样的小动物。这只鼠浑身呈黄褐色,背上有5条黑色条纹。老周和一起巡逻的同志找来一个铁笼,准备把小鼠装进去保护起来。但是这个小家伙在被逮住放入笼中的一刹那,咬了老周的指头一下,被咬出的小孔开始渗血……

经过懂行的人辨认,这是一只花鼠,属于松鼠科,是“国家保护的有益的或者具有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物”,经过治疗,当日晚间就已将其放生。

对于伤口的处理,老周只是用酒精棉球仔细擦了擦,但这样做行不行,他心里也没底。

时下,许多稀奇古怪的动物被养做宠物,如蛇、龙猫、蜥蜴、荷兰猪、金龟子、虎皮鹦鹉等,像老周一样被不常见的动物咬伤的事故也屡有发生。

此外,喜爱郊游探险的市民也越来越多,在野外玩耍时,不时有被动物咬伤或抓伤的事情发生。

面对这些情况,该如何处理伤口,难道都要打狂犬疫苗?或者只有打狂犬疫苗吗?

记者多方求证专家,并上网搜索了一部分信息,供读者们参考。

巡防队员老周被花鼠咬伤了 到底该打狂犬疫苗,还是注射抗生素?

被不同的动物咬伤了,如何处理? 别怕别怕,这里有“灵丹妙药”

如今稀奇古怪的宠物越来越多,了解这方面的知识很有必要



被猫咬伤或抓伤后(被狗、花鼠、龙猫等咬伤后处理方法基本如此):

处理:1.冲洗伤口。要马上用流动的水冲洗伤口,尽可能把病毒冲走,把血挤出去。如果有条件,最好用20%的肥皂水进行冲洗,连续冲上20分钟到30分钟。接着用碘酒消毒,再用酒精洗掉碘酒,如此反复3次。

- 2.马上到当地防疫部门注射疫苗,绝不能拖几天才去注射。
- 3.如果伤口被咬得严重,一定要注射抗病毒血清,与疫苗同时使用。

被蛇咬伤后:

处理:1.局部紧急处理。应立即停止伤肢活动,就地取材在伤口上方(近心端)的相应部位进行结扎,20至30分钟松解一次约2至3分钟。一般在注射抗蛇毒素或服用蛇药后,结扎可解除。切开冲洗。用双氧水或肥皂水冲洗,然后切开,亦可用吸乳器或拔火罐进行负压吸引;也可用嘴吸(口腔破溃不能用此法)。敷料包扎后伤肢置于低位。局部解毒。用结晶胰蛋白酶在伤周注射。

- 2.抗蛇毒治疗。用抗蛇毒血清,蛇药口服。
- 3.严重中毒的给予对症治疗。另外蛇咬伤的伤口易感染,应给抗生素和破伤风抗毒素。



被甲鱼咬伤后:

处理:解脱甲鱼后,应尽量从伤口内挤出少量鲜血,以防止伤口感染。被咬处应用2%的碘酊(无破损者)或75%酒精擦洗消毒。有条件者最好去医院注射一针破伤风抗毒素。

被毛毛虫蜇伤后:


- 1.先在放大镜观察下,用刀片顺着毒毛方向刮除毒毛,然后在患处涂擦3%氨水。
- 2.可用南通蛇药外敷患处,也可以用七叶一枝花或鲜马齿苋捣烂外敷。
- 3.伤口溃烂时,可用抗生素软膏涂抹。
- 4.症状严重者,应尽快到医院诊治。



被老鼠咬伤后

应及时、全程、足量注射人用狂犬病疫苗。注射人用狂犬病疫苗最佳时间是在被伤24小时内,如果超过48小时注射,首次注射剂量需加倍。

由于花鼠与老鼠同属温血哺乳动物,记者已向老周建议,还是赶紧补打狂犬疫苗。



被蝎子蜇伤后:

处理:蝎子的毒呈酸性,可以用碱性肥皂水(别用香皂)、苏打水、3%氨水涂在伤口处。如果有蛇药的话,用温开水化开抹在伤口上,没药也可用泡开的冷茶叶(碱性)敷上。在伤肢上端2~3厘米处,用布带扎紧,每15分钟放松1~2分钟,伤口周围可用冰敷,切开伤处皮肤,用抽吸器或拔火罐等吸出毒液,并选用高锰酸钾液、石灰水冲洗伤口。

被蜂蜇伤后:

处理:蜜蜂蜇伤可用弱碱性溶液外敷,以中和酸性毒素。黄蜂蜇伤则用弱酸性溶液中和。如果蜂刺留在伤口内,用小针挑拨或胶布粘贴,取出蜂刺,切记不要挤压。局部症状较重者,可采用火罐拔毒和局部封闭疗法,并给止痛剂或用抗组胺药止痒。也可采用中草药外敷。有全身症状者,须立即就医进行对症治疗。



被猴子咬伤或抓伤后:

- 1.彻底冲洗。先用肥皂水、清水、洗涤剂或对病毒有可靠杀灭效果的碘制剂、乙醇等彻底冲洗伤口至少20分钟。
- 2.严格消毒咬伤处。在彻底冲洗后,用2%~3%碘酒或75%酒精涂于伤口,以清除或杀灭局部的病毒。
- 3.酌情处置。对未伤及大血管的伤口尽量不要缝合,也不必包扎。对需要缝合的较大的咬伤伤口或比较严重的面部伤口,应在清创消毒后,先用狂犬病免疫血清或免疫球蛋白浸润伤口,数小时后(不低于2小时)再予以缝合和包扎。
- 4.使用免疫制剂。对于有皮肤损害及免疫功能低下者,应在接种疫苗的同时,在咬伤口周围浸润注射猴源性抗血清或人源免疫球蛋白。

被蜈蚣咬伤后:

处理:立即用弱碱性溶液洗涤伤口和冷敷,或用等量雄黄、枯矾研磨,以浓茶或烧酒调匀敷伤口。疼痛较重者给予止痛或伤口周围封闭,亦可用蛇药片内服或外敷,必要时清创。局部坏死、感染者和急性淋巴管炎者,应加用抗菌药物。



被马咬伤后:

处理:马一般不会咬人,但偶尔也可能发怒咬人,被马咬伤的患患者,常感剧烈疼痛,伤口出血,局部肿胀。处理办法是,用盐水或凉开水冲洗局部,然后再用2%醋酸砒土水或1%盐糖水冷敷包扎。并根据伤口具体情况,必要时注射抗毒素或作其他处理。



哪些动物会感染狂犬病

几乎所有的温血动物都可感染狂犬病。动物对狂犬病病毒的敏感性如下:

最敏感:狐狸、山狗、袋鼠和棉鼠等。

敏感:地鼠、臭鼬、浣熊、猫鼬、蝙蝠、豚鼠、兔和其他啮齿类。

中度敏感:狗、牛、马、绵羊和灵长类。

