

9月11日~20日

全省2000多万儿童免费接种麻疹疫苗

以前接种过的,此次也要接种

昨日,省卫生厅召开2010年河南省麻疹疫苗强化免疫活动新闻通气会,宣布我省麻疹疫苗强化免疫9月11日~20日统一开展。

此次强化免疫活动是全国统一行动,目的是实现2012年消除麻疹的目标。经过前期摸底调查,我省麻疹疫苗强化免疫活动涉及目标人群2094万,占全国总量的1/5。按照国家卫生部安排,此次接种不受户籍和地域限制,所有符合条件的儿童一律免费接种。

家长可通过卫生部官方网站 <http://www.moh.gov.cn/>, 中国疾病预防控制中心网站 <http://www.chinacdc.cn/>, 河南省疾病预防控制中心网站 <http://www.hncdc.com.cn/> 查阅相关信息。同时,还可拨打9616622河南省疾病预防控制中心传染病预防咨询热线咨询相关信息。

晚报记者 邢进

全国统一行动,本月11日启动

我国目前麻疹疫苗的常规免疫程序是8月龄接种第一剂次,18~24月龄接种第二剂次。

本次麻疹疫苗强化免疫,全国集中在2010年9月11日~20日统一开展,我省目标人群是8月龄~14岁的儿童,即1995年10月1日~2009年12月31日出生的儿童。

无论既往麻疹疫苗免疫史及患病史如何,凡无麻疹疫苗接种禁忌症的儿童,均接种1剂次(0.5毫升)麻疹疫苗。

家长可带孩子到居住所在地的预防接种单位接种麻疹疫苗,具体请看当地通知或向当地疾病预防控制中心咨询。

本次强化免疫对儿童家长不收取任何费用,疫苗及注射器费用均由国家财政负担。

在强化免疫期间,各接种点按规定只提供国家统一配发的,经过严格检测的免费麻疹疫苗。

这些情况不能接种或暂缓接种

麻疹疫苗接种有一定的禁忌症,有以下5种情况者,均不能接种疫苗:

1. 已知对该疫苗所含任何成分,包括辅料及抗生素过敏者(如对硫酸庆大霉素或硫酸卡那霉素过敏)。
2. 曾患过敏性喉头水肿、过敏性紫癜、过敏性休克、阿瑟氏反应、血小板减少性紫癜等严重过敏性疾病。
3. 正患急性疾病、严重慢性疾病、或处于慢性疾病的急性发作期。
4. 有免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗。

5. 曾患或正患多发性神经炎、格林巴利综合征、急性播散性脑脊髓炎、脑病、癫痫等严重神经系统疾病,或其他进行性神经系统疾病。

有以下3种情况的孩子,暂不能接种麻疹疫苗,可在以后条件适宜时补种:

1. 3个月内接种过免疫球蛋白。
2. 近期注射过麻疹疫苗或其他减毒活疫苗,需间隔1个月后再补种。
3. 强化免疫期间有感冒、发热等症状,待恢复健康后补种。

以前接种过麻疹疫苗的此次也要接种

麻疹疫苗接种后,一般情况下个体可以得到有效保护。但这也根据受种者年龄及个人体质不同而异,接种后没有产生抗体的情况称为免疫不成功,这部分人在周围有麻疹流行时有可能被感染。

强化免疫为各种原因导致免疫不成功的人群提供了一次补种机会,特别是免疫史不详或未完成2剂次免疫的人群尤为必要。

除具有接种禁忌症的人群外,其他目标人群都应该按

照当地政府的统一部署,在强化免疫期间接种麻疹疫苗。

在孩子接种麻疹疫苗前,家长要如实向医生反映孩子的既往病史、近期身体状况、家族病史和以往疫苗接种反应史。

空腹和疲劳时不宜接种,防止出现“晕针”,接种后注意休息,不要做较为激烈的活动,多喝水,注意保暖,适当休息,不要吃辣椒等刺激性食物,暂时不要洗澡。

接种以后要在接种点观察30分钟,如有任何不适,要及时向接种单位或医生报告和就诊。

少数人可能出现的不良反应

1. 接种疫苗24小时内,在接种部位出现疼痛或触痛,通常在2~3天内自行消失。

2. 接种疫苗后1~2周内,可能出现一过性发热反应,其中大多数为轻度发热反应,持续1~2天后自行缓解。

3. 接种疫苗后6~12天内,少数儿童可能出现一过性皮疹,一般不超过两天可自行缓解。

如果孩子接种后,出现发热在37.1℃~37.5℃时,应加强观察,适当休息,多喝水,防止继发其他疾病。

当发热超过37.5℃,或37.5℃以下并伴有其他全身症状,异常哭闹等情况,应及时到医院诊治。

对于红肿直径小于1.5厘米的局部反应,一般不需任何处理;对于红肿直径1.5厘米~3厘米的局部反应,可用干净的毛巾热敷,每日数次,每次10~15分钟;对于红肿直径大于3厘米的局部反应,应及时到医院就诊。